

# THERMO - SEANCE TD 8 - GROUPE 151.

## COURS TERMINÉ

→ Dernière séance le 12/12/2020 = DS en présentiel

CALORIMÉTRIE (FEUILLE TD2)

TRAVAIL (FEUILLE TD3)

$$\left( \frac{\partial x}{\partial y} \right)_z \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)_z = 1$$

$$\left( \frac{\partial x}{\partial y} \right)_z \left( \frac{\partial y}{\partial z} \right)_x \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right)_y = -1$$

$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \chi_T \end{pmatrix}$  Définitions  
à retenir

CALORIMÉTRIE :  $Q, \delta Q$

$C_v, C_p$

$L_{vap}, L_{liq}$

Transformation isochore :  $\delta Q = C_v dT$

" isobare :  $\delta Q = C_p dT$

TRAVAIL :  $W, \delta W$

$$\delta W = -P_{ext} dV = \begin{cases} -P dV & (\text{QS}) \\ -P_g dV & (\text{brutale}) \end{cases}$$

EXERCICE 3 - TRAVAIL REÇU PAR UN GAZ POUR  
DIFFÉRENTS CHEMINS SUIVIS (= PAR DIFFÉRENTES  
TRANSFORMATIONS).

$n = 2$  moles de dioxygène

$$PV = nRT$$

Réversible = quasi-statique ici

État A ( $P_A, V_A, T_A$ ) à État B ( $P_B = 3P_A, V_B, T_B = T_A$ )

3 transformations :

(1) isotherme


(2) "droite dans le diagramme (P,V)"

(3) isochore puis isobare

En thermo, on manipule beaucoup les diagrammes :

→ (T,H) : diagramme enthalpique

→ (P,T)




C : point critique

T : point triple

→  $(T, S)$  : diagramme entropique

→  $(P, V)$  : diagramme de Clapeyron



Pour une transformation quasi-stat. pr.,  $P_{ext} = P$  et

$$\delta W = -P dV$$

$$W = - \int_A^B P dV$$

Variété indépendante :  $x = V$

" dépendante :  $y = P$   
 $= f(x)$

$$- \int f(x) dx$$

AIRÉ DANS  
LE DIAGRAMME  
 $(P, V)$

ETAPE 1: exprimer  $V_B$  en fonction de  $V_A$

$$PV = nRT$$

$$P_A V_A = nRT_A \quad (+)$$

$$P_B V_B = nRT_B \quad (+ +)$$

Or à priori l'énoncé :

$$P_B = 3P_A$$

$$T_B = T_A$$

Donc (\*\*\*)  $\Rightarrow P_B V_B = (3P_A) V_B = nRT_B = nRT_A$

$\Rightarrow 3P_A V_B = nRT_A$

$\Rightarrow V_B = \frac{nRT_A}{3P_A}$

Or d'après (\*),  $V_A = \frac{nRT_A}{P_A}$

On trouve donc que :  $V_B = \frac{V_A}{3}$

**ETAPE 2 :** Représentation dans le diagramme de Clapeyron


(a) Représenter les états A ( $P_A, V_A$ ) et B ( $3P_A, \frac{V_A}{3}$ )

(b) Représenter les 3 courbes correspondant à chaque transformation

(2) Statis dans le diagramme de Clapeyron


(3) Isochore puis isobare  
( $V$  constant) ( $P$  constant)

(1) Isotherme ( $PV = nRT$ )  $\Rightarrow PV = \text{constante}$   
 $\Rightarrow yx = K$   
 $\Rightarrow y = \frac{K}{x}$   
 HYPERBOLE




## REMARQUES :


- (1) Pour un gaz parfait, les isothermes correspondent à des hyperboles dans le diagramme (P,V)



- (2) Les transformations 1, 2 et 3 étant réversibles donc quasi-statiques, on peut les tracer dans nos diagrammes thermodynamiques puis à partir des successions d'états d'équilibre




## TRANSFORMATION 2



$$\begin{aligned}
 W_2 &= \text{base} \times \text{hauteur} \\
 &= (V_A - V_B) (P_B - 0) \\
 &= \left(V_A - \frac{V_A}{3}\right) (3P_A) \\
 &= \frac{2}{3} V_A \times 3P_A \\
 &\quad \checkmark
 \end{aligned}$$

$$W_2 = 2 P_A V_A = 2 n R T_A$$



## TRANSFORMATION 3

$$\begin{aligned}
 W_1 &= - \int_A^B P(V) dV \\
 &= - \int_A^B \frac{n R T_A}{V} dV \\
 &= - n R T_A \int_{V_A}^{V_B} \frac{1}{V} dV = - n R T_A [\ln V]_{V_A}^{V_B = V_A/3}
 \end{aligned}$$

$$W_1 = - n R T_A \left[ \ln\left(\frac{V_A}{3}\right) - \ln(V_A) \right] = - n R T_A \ln\left(\frac{V_A}{3} \times \frac{1}{V_A}\right) \Rightarrow \boxed{W_1 = n R T_A \ln 3}$$


REMARQUE il s'agit de calculs d'aires signées.

Exercice: Soit  $f: x \mapsto y = f(x)$  fonction

( $\forall x \in I, f(x) \geq 0$ ).


Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$



$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \geq 0$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq 0 \text{ puisque } a > b$$



$$\left( \begin{aligned} \ln a - \ln b &= \ln \frac{a}{b} \\ \ln \left( \frac{1}{a} \right) &= -\ln a \end{aligned} \right)$$

$$\begin{aligned} -nR T_A \left[ \ln V \right]_{\frac{V_A}{3}}^{V_B = \frac{V_A}{3}} &= -nR T_A \left( \ln \left( \frac{V_A}{3} \right) - \ln \left( V_A \right) \right) \\ &= -nR T_A \ln \left( \frac{V_A/3}{V_A} \right) \\ &= -nR T_A \ln \left( \frac{1}{3} \right) \\ &= -nR T_A (-\ln 3) \\ &= nR T_A \ln 3 \end{aligned}$$

$$W_1$$
$$nRT_A \ln 3$$

$$W_2$$
$$2nRT_A$$

$$W_3$$
$$\frac{4}{3} nRT_A$$